



# La dermatite des paturons

**La dermatite des paturons est une inflammation de la peau localisée entre le sabot et le boulet.** Il s'agit là d'une description des symptômes cliniques et non d'un diagnostic précis.

Cette pathologie a de très nombreuses causes. La réussite du traitement dépendra de la pertinence du diagnostic étiologique bien que celui-ci soit parfois difficile et que l'inflammation de la peau se manifeste de la même façon quelle qu'en soit l'origine.

## Causes de la dermatite des paturons

- **Gale de boue** : infection par des bactéries appelée aussi dermatophilose ;
- **Acariens des membres** : gale chorioptique ;
- **Infection par des acariens d'été/automne** : trombiculose ;
- **Teigne** : infection par les espèces *Trichophyton* ou *Microsporum* ;
- **Folliculite** : infection profonde des follicules pileux par des staphylocoques ;
- **Vasculite** : maladie auto-immune sévère affectant la peau blanche des membres ;
- **Photosensibilisation** : la peau des balzanes devient sévèrement brûlée malgré une exposition solaire modérée. Ceci est le plus souvent dû à une pathologie hépatique ou à une intoxication végétale.
- Il y a aussi d'autres cas plus rares de dermatites des paturons.



**UNE PHOTOSENSIBILISATION PEUT PROVOQUER UNE DERMATITE DES PATURONS**

## SIGNES CLINIQUES

- **Les signes cliniques** sont le plus souvent visibles lors d'un examen attentif du paturon mais cela peut être plus difficile chez les races lourdes en raison des longs poils.
- On observe le plus souvent : une **rougeur de la peau, des croûtes et de la douleur** de la zone atteinte.
- Dans certains cas, comme lors de **gale chorioptique**, on observe une démangeaison et le cheval peut se gratter, se mordre ou taper du pied.
- Dans les cas les plus sévères, on observe une **enflure du ou des membres atteints et une boiterie** qui varie de légère à grave. Le plus souvent l'enflure et la boiterie diminuent à l'exercice et s'aggravent au repos.

## POINTS CLES

**La dermatite des paturons n'est pas une maladie en elle-même mais regroupe un ensemble de pathologies qui affectent toutes la peau du bas des membres.**

L'intensité de la douleur, des démangeaisons ou de la boiterie est variable et dépend de l'origine de la dermatite.

L'identification de la cause est la clé d'un traitement réussi.

Plus le vétérinaire intervient tôt, plus le diagnostic est facile.

# La dermatite des paturons

## Diagnostic

Dans certains cas, l'examen clinique suffit à poser le diagnostic mais le plus souvent **des examens complémentaires sont nécessaires** comme :

- Raclage cutané
- Epreuve au ruban adhésif
- Ecouvillon pour culture bactérienne ou fongique
- Biopsie
- Prise de sang

Les cas qui durent depuis longtemps et qui ont déjà reçu des traitements sont les plus difficiles à diagnostiquer avec précision. Aussi, il est conseillé de faire appel au vétérinaire assez tôt. Parfois une infection secondaire peut venir compliquer la maladie d'origine.



**LE PLUS SOUVENT LE TRAITEMENT IMPLIQUE LA TONTE DES ZONES ATTEINTES ET LE NETTOYAGE AVEC UNE SOLUTION ANTISEPTIQUE DOUCE**

## TRAITEMENT

Les **principes généraux de traitement** décrits par la suite s'appliquent à la plupart des cas mais parfois d'autres traitements spécifiques seront nécessaires en fonction de l'origine de la dermatite.

- **Les membres doivent être maintenus au sec** ; un bandage est donc parfois nécessaire.
- **Les croûtes doivent être tondues** afin de mettre à nu la peau des zones atteintes.
- Si un parasite, un champignon ou une bactérie sont suspectés, des **traitements spécifiques** devront être employés.
- **Des crèmes ou des huiles** seront parfois utiles pour aider à retirer les croûtes, ce qui peut être douloureux.
- **Une solution antiseptique diluée** peut être utilisée pour nettoyer doucement la peau.
- L'application locale d'une **crème antiseptique, antifongique ou à base de corticostéroïdes** peut être utile.
- Si le soleil aggrave les symptômes, un bandage devra être posé pour **protéger de l'exposition solaire**.



**PEGAS** est un nouveau concept où des vétérinaires équins indépendants localisés en France, se regroupent et s'engagent ensemble pour apporter aux chevaux les meilleurs soins possibles afin de satisfaire leurs clients.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans l'accord préalable de l'éditeur

Pour plus d'information contactez :

Clinique Equine De Conques

33420 Saint-Aubin De Branne

Tél : 05 57 74 94 21

contact@cliniquedeconques.com